

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 18-6-73 537842

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

30 francs

N° 153 - JUIN 1973

2° supplément

CULTURES LEGUMIERES

TOMATES -

ALTERNARIA : A la suite des récentes pluies orageuses des attaques de cette maladie peuvent se manifester ou s'aggraver, si comme nous l'avons observé à une ou deux reprises, les jeunes plants repiqués avaient déjà subi, en pépinière, une première attaque d'alternaria.

Utiliser un des fongicides suivants (doses de M.A./hl) : Mancozèbe 160 grs - Manèbe 160 grs - Captafol 80 grs ou Propinèbe 210 grs.

Renouveler les traitements après chaque pluie supérieure à 5 mm.

ASPERGES -

CHENILLE A FOURREAU : Compte-tenu de la biologie de ce parasite le premier traitement devra être exécuté le 25 juin. Les insecticides suivants peuvent être utilisés :

Parathion	50 g. de M.A. à 1'hectolitre	Fenthion	100 g. de M.A. à 1'hectolitre
Oléoparathion	45 g. de M.A. à "	Carbaryl	150 g. de M.A. à "
Azinphos	40 g. de M.A. à "	Lindane	75 g. de M.A. à "
Phosalone	120 g. de M.A. à "	Carbophénothion	120 g. de M.A. à "
		Diethion	120 g. de M.A. à "

Il conviendra de faire : 2 traitements à 12 jours d'intervalle si l'on utilise le Carbaryl, 3 traitements à 8 jours d'intervalle avec l'un des autres insecticides.

A l'exception du Carbaryl, qui est une poudre mouillable, tous les autres insecticides devront être utilisés sous forme d'émulsion.

Les pontes et les pénétrations des jeunes larves ayant lieu à la base de turions, il faut donc traiter ces derniers au niveau du sol et obtenir la pénétration de la bouillie à 4 ou 5 cm de profondeur.

Le traitement sera exécuté avec un pulvérisateur, sans rechercher une très forte pression, à raison de 2000 à 2500 litres de bouillie à l'hectare. Ces quantités ne constituent qu'un ordre de grandeur car l'importance du volume de bouillie peut varier selon la densité de la plantation, l'âge de l'aspergière et le nombre de turions par touffe.

Dans les plantations peu attaquées d'une superficie supérieure à 1 ou 2 ha, le traitement pourra être appliqué, par mesure d'économie, sur les 5 premières rangées de la parcelle. En effet l'infestation commence toujours par les bordures et se poursuit lentement vers l'intérieur.

P.165

CULTURES FRUITIÈRES

ORDEUSE ORIENTALE -

Les captures consécutives au vol de deuxième génération s'intensifient dans tous les postes de piégeages de la Circonscription; dans la basse vallée du Rhône il semble que de deuxième vol ait débuté un peu plus tôt qu'à Montpellier; il paraît plus tardif dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

La protection des fruits doit être assurée :

Choisir l'insecticide permettant de respecter les délais d'emploi prévus par la réglementation.

Pour les fruits arrivant à maturité au cours de la première quinzaine de juillet commencer les traitements au rythme de 1 traitement tous les 12 jours.

Les traitements lavés par la pluie doivent être renouvelés.

PUCERONS -

Dans certains vergers ces ravageurs se sont développés assez brutalement et nécessitent une intervention. Dans les vergers de pêcheurs choisir un insecticide également actif vis-à-vis de la Tordeuse orientale. Dans les vergers de pommiers utiliser une spécialité efficace contre le Carpopapse.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES -

Les captures sont extrêmement faibles dans les vergers de plaines littorales, du Gard et de l'Hérault ; un peu plus importantes dans le Narbonnais ; plus conséquentes dans les Cévennes. En conséquence nous estimons qu'un traitement est indispensable pour assurer la protection des vergers situés dans les régions :

2, 4, 6, 7, II, 16, 17, 21

OIDIUM DU PECHER -

La maladie persiste en particulier sur Nectarine.

Ajouter aux pulvérisations insecticides un anticryptogamique approprié.

CYLINDROSPORIOSE DU CERISIER -

Un traitement est indispensable après la récolte dans tous les vergers où la maladie a été observée.

P. CHRESTIAN - L.L. TROUILLO.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLÉ

Tirage du 14 juin 1973 - 2500 exemplaires
Précédent tirage le 7 juin.